



PROGRAMA NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA

Tratamiento para casos de malaria no complicada



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**



Ministerio del Poder Popular
para la Salud



**Tratamiento de
infecciones por
*Plasmodium vivax***

Tratamiento con Arteméter + lumefantrina
para infecciones no complicadas *Plasmodium vivax* para niños menores de 10 kg – vía oral

Medicamento	Nº Días	Peso en kg	Días de tratamiento		
Arteméter + Lumefantrina 20mg / 120 mg	3	Menores de 10 kg	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
			1 tab c / 12h	1 tab c / 12h	1 tab c / 12h

Tratamiento con cloroquina 150 mg base más primaquina 5 mg por 14 días
para infecciones no complicadas *Plasmodium vivax* en pacientes de 10 a 43 kg de peso – vía oral

Peso (kg)	Número de tabletas de medicamento por día						
	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DEL DÍA 4 AL DÍA 14
	Cloroquina 150 mg	Primaquina 5 mg	Cloroquina 150 mg	Primaquina 5 mg	Cloroquina 150 mg	Primaquina 5 mg	Primaquina 5 mg
10 a 12 kg	1	1	½	1	½	1	1 tableta del día 4 al día 14
13 a 14 kg	1	1	1	1	½	1	1 tableta del día 4 al día 14
15 a 19 kg	1	1	1	1	1	1	1 tableta del día 4 al día 14
20 a 24 kg	2	1	1	1	1	1	1 tableta del día 4 al día 14
25 a 31 kg	2	2	2	2	1	2	2 tabletas del día 4 al día 14
32 a 37 kg	2	2	2	2	2	2	2 tabletas del día 4 al día 14
38 a 43 kg	3	2	2	2	2	2	2 tabletas del día 4 al día 14

Tratamiento con cloroquina 150 mg base más primaquina 15 mg para infecciones no complicadas por *Plasmodium vivax* en pacientes de 44 a 120 kg de peso – vía oral

Peso (kg)	Número de tabletas de medicamento por día						
	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DEL DÍA 4 EN ADELANTE
	Cloroquina 150 mg	Primaquina 15 mg	Cloroquina 150 mg	Primaquina 15 mg	Cloroquina 150 mg	Primaquina 15 mg	Primaquina * 15 mg
44 a 55 kg	3	1	3	1	3	1	1 tableta del día 4 al día 14
56 a 61 kg	4	1	4	1	2	1	1 tableta del día 4 al día 14
62 a 70 kg	4	1	4	1	3	1	1 tableta del día 4 al día 14
70 a 79 kg	4	1	4	1	4	1	1 tableta del día 4 al día 16
80 a 89 kg	4	1	4	1	4	1	1 tableta del día 4 al día 18
90 a 99 kg	4	1	4	1	4	1	1 tableta del día 4 al día 20
100 a 109 kg	4	1	4	1	4	1	1 tableta del día 4 al día 22
110 a 120 kg	4	1	4	1	4	1	1 tableta del día 4 al día 24

*Siempre completar los 3.5 mg / kg dosis total de primaquina



**Tratamiento de
infecciones por
*Plasmodium falciparum***

Primera línea – vía oral	Peso en kg	Días de tratamiento		
		DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
Arteméter + lumefantrina* 20mg / 120 mg	Menores de 15 kg	1 tab c / 12 h	1 tab c / 12 h	1 tab c / 12 h
	15 – 24 kg	2 tabs c / 12 h	2 tabs c / 12 h	2 tabs c / 12 h
	25 - 34 kg	3 tabs c / 12 h	3 tabs c / 12 h	3 tabs c / 12 h
	de 35 kg y más	4 tabs c / 12 h	4 tabs c / 12 h	4 tabs c / 12 h
Más primaquina tabletas de 15; 7,5 y 5 mg	0.50 mg / kg peso (dosis única)			

*Evitar cítricos y puede tomarse con alimentos grasos

Segunda línea – vía oral	Peso en kg	Días de tratamiento		
		DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
Artesunato + mefloquina (25 / 55 mg)	5 - 8 kg	1 tab	1 tab	1 tab
	9 – 17 kg	2 tabs	2 tabs	2 tabs
Artesunato + mefloquina (100 / 200 mg)	18 - 29 kg	2 tabs	1 tab	1 tab
	30 - 80 kg	2 tabs	2 tabs	2 tabs
	más 80 kg	3 tabs	3 tabs	3 tabs
Más primaquina tabletas de 15; 7,5 y 5 mg	0.50 mg / kg peso (dosis única)			

Tercera línea – vía oral	Días de tratamiento						
	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7
Quinina sulfato tabletas de 300 y 500 mg	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h
Más clindamicina cápsula 300 mg o doxiciclina cápsula 100 mg	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h
	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día
Más primaquina tabletas de 15 mg; 7,5 mg y 5 mg	0.50 mg / kg peso (dosis única)						



Tratamiento de
infecciones
mixtas por
P. falciparum
y *P. vivax*

Primera línea – vía oral	Peso en kg	Días de tratamiento		
		DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
Arteméter + lumefantrina* 20mg / 120 mg	Menores de 15 kg	1 tab c / 12 h	1 tab c / 12 h	1 tab c / 12 h
	15 – 24 kg	2 tabs c / 12 h	2 tabs c / 12 h	2 tabs c / 12 h
	25 – 34 kg	3 tabs c / 12 h	3 tabs c / 12 h	3 tabs c / 12 h
	De 35 kg y más	4 tabs c / 12 h	4 tabs c / 12 h	4 tabs c / 12 h
Más primaquina tabletas de 15; 7,5 y 5 mg	Siempre completar los 3,5 mg / kg dosis total			

*Evitar cítricos. Puede tomarse con alimentos grasos

Dosis de primaquina

Peso (kg)	Primaquina 5 mg	Peso (kg)	Primaquina 15 mg
10 a 12 kg	1 tableta del día 1 al día 14	44 a 55 kg	1 tableta del día 1 al día 14
13 a 14 kg	1 tableta del día 1 al día 14	56 a 61 kg	1 tableta del día 1 al día 14
15 a 19 kg	1 tableta del día 1 al día 14	62 a 70 kg	1 tableta del día 1 al día 14
20 a 24 kg	1 tableta del día 1 al día 14	70 a 79 kg	1 tableta del día 1 al día 16
25 a 31 kg	2 tabletas del día 1 al día 14	80 a 89 kg	1 tableta del día 1 al día 18
32 a 37 kg	2 tabletas del día 1 al día 14	90 a 99 kg	1 tableta del día 1 al día 20
38 a 43 kg	2 tabletas del día 1 al día 14	100 a 109 kg	1 tableta del día 1 al día 22
		110 a 120 kg	1 tableta del día 1 al día 24

Segunda línea – vía oral	Peso en kg	Días de tratamiento		
		DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
Artesunato + mefloquina (25 / 55 mg)	5 - 8 kg*	1 tab	1 tab	1 tab
	9 - 17 kg	2 tabs	2 tabs	2 tabs
Artesunato + mefloquina (100 / 200 mg)	18 - 29 kg	2 tabs	1 tab	1 tab
	30 - 80 kg	2 tabs	2 tabs	2 tabs
	Más 80 kg	3 tabs	3 tabs	3 tabs
Más primaquina tabletas de 15; 7,5 y 5 mg	Siempre completar los 3,5 mg / kg dosis total			

Dosis de primaquina			
Peso (kg)	Primaquina 5mg	Peso (kg)	Primaquina 15mg
10 a 12 kg	1 tableta del día 1 al día 14	44 a 55 kg	1 tableta del día 1 al día 14
13 a 14 kg	1 tableta del día 1 al día 14	56 a 61 kg	1 tableta del día 1 al día 14
15 a 19 kg	1 tableta del día 1 al día 14	62 a 70 kg	1 tableta del día 1 al día 14
20 a 24 kg	1 tableta del día 1 al día 14	70 a 79 kg	1 tableta del día 1 al día 16
25 a 31 kg	2 tabletas del día 1 al día 14	80 a 89 kg	1 tableta del día 1 al día 18
32 a 37 kg	2 tabletas del día 1 al día 14	90 a 99 kg	1 tableta del día 1 al día 20
38 a 43 kg	2 tabletas del día 1 al día 14	100 a 109 kg	1 tableta del día 1 al día 22
		110 a 120 kg	1 tableta del día 1 al día 24

Tercera línea – vía oral	Días de tratamiento						
	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7
Quinina sulfato tabletas de 300 y 500 mg	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h	10 mg / kg cada 8 h
Más clindamicina cápsula 300 mg o doxiciclina cápsula 100 mg	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h	10 mg / kg cada 12 h
	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día	4 mg / kg / día
Más primaquina tabletas de 15 mg; 7,5 mg y 5 mg	Siempre completar los 3,5 mg / kg dosis total						

Dosis de primaquina			
Peso (kg)	Primaquina 5mg	Peso (kg)	Primaquina 15 mg
10 a 12 kg	1 tableta del día 1 al día 14	44 a 55 kg	1 tableta del día 1 al día 14
13 a 14 kg	1 tableta del día 1 al día 14	56 a 61 kg	1 tableta del día 1 al día 14
15 a 19 kg	1 tableta del día 1 al día 14	62 a 70 kg	1 tableta del día 1 al día 14
20 a 24 kg	1 tableta del día 1 al día 14	70 a 79 kg	1 tableta del día 1 al día 16
25 a 31 kg	2 tabletas del día 1 al día 14	80 a 89 kg	1 tableta del día 1 al día 18
32 a 37 kg	2 tabletas del día 1 al día 14	90 a 99 kg	1 tableta del día 1 al día 20
38 a 43 kg	2 tabletas del día 1 al día 14	100 a 109 kg	1 tableta del día 1 al día 22
		110 a 120 kg	1 tableta del día 1 al día 24



**Tratamiento de malaria
no complicada en
mujeres embarazadas,
mujeres lactantes y niños
menores de 6 meses**

Tratamiento *Plasmodium falciparum* y *Plasmodium malariae* – vía oral

Medicamentos	Días de tratamiento		
	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
Cloroquina Tabletas de 150 mg base	10 mg / kg peso	10 mg / kg peso	5 mg / kg peso

Realizar seguimiento clínico parasitológico (gota gruesa) los días
1, 3, 7, 14, 21 y 28 del inicio de tratamiento

Tratamiento *Plasmodium falciparum* e Infección Mixta
(*Plasmodium falciparum* y *Plasmodium vivax*) - vía oral

Primer trimestre de embarazo

Primera Línea	Días de tratamiento
	DEL DÍA 1 AL DÍA 7
Quinina sulfato tabletas de 300 y 500 mg	10 mg / kg cada 8 h
Más clindamicina cápsula 300 mg	10 mg / kg cada 12 h
Segunda Línea	Arteméter + Lumefantrina 20 mg / 120 mg

Segundo y tercer trimestre de embarazo

Medicamentos	Peso en kg	Días de tratamiento
		DEL DÍA 1 AL DÍA 3
Arteméter + Lumefantrina 20mg / 120mg	De 35 kg y más	4 tabletas cada 12 h

Se recomienda la administración de lumefantrina con alimentos grasos y evitar cítricos

Tratamiento de malaria no complicada en mujeres embarazadas, mujeres lactantes y niños menores de 6 meses

Tratamiento de seguimiento postinfección por *Plasmodium vivax* o Infección Mixta
(*Plasmodium falciparum* y *Plasmodium vivax*) - vía oral

Comenzar una (1) semana posterior de completado el tratamiento inicial


TRATAMIENTO HASTA LOS SEIS (6) MESES POSTERIORES AL PARTO O NACIMIENTO

Una vez a la semana

5 mg / kg peso (solo se administra cloroquina por semana en caso de *P. vivax*)

**Realizar seguimiento clínico parasitológico (gota gruesa) los días
1, 3, 7, 14, 21 y 28 del inicio de tratamiento**

En ningún caso se empleará PRIMAQUINA en embarazadas, durante la lactancia materna, ni en niños menores de 6 (seis) meses.



**Tratamiento de
infecciones por
P. malariae y
para recaídas por
*Plasmodium vivax***

Tratamiento con cloroquina más primaquina para recaídas no complicadas por *Plasmodium vivax* – vía oral

Medicamentos	Primera o más recaídas
Cloroquina tabletas de 75mg; 150 mg base	Dosis total: 25 mg base / kg 10 mg / kg el primer día, 10 mg / kg segundo día y 5 mg / kg el tercer día
Primaquina tabletas de 15 mg; 7,5mg y 5 mg	Primera recaída: Tratar como caso nuevo Segunda o más recaídas: Duplique la dosis de primaquina que uso en la primera recaída.

Tratamiento para infecciones por *Plasmodium malariae* – vía oral

Medicamentos	Días de tratamiento		
	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
Cloroquina tableta de 75 mg y 150 mg base	10 mg / kg peso	10 mg / kg peso	5 mg / kg peso

PROGRAMA NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas



Gobierno
Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Salud