

¿Cómo se diagnostica el zika?

- Un médico u otro proveedor de atención médica le preguntará acerca de los viajes recientes que haya hecho, y los signos y síntomas que tenga.
- Una prueba de detección en sangre u orina puede confirmar la infección por el virus del Zika.




¿Quiénes se deben realizar las pruebas de detección del zika?

- Cualquiera que tenga síntomas de zika o los haya tenido en el último tiempo
 - Y viva en un área con riesgo de zika o haya viajado a un área con riesgo, o
 - Haya tenido relaciones sexuales sin protección con una pareja que vive en un área con riesgo de zika o viajó a un área con riesgo



¿Quiénes se deben realizar las pruebas de detección del zika?

- Todas las mujeres embarazadas (independientemente de los síntomas que
 - Vivan en un área con riesgo de zika o haber viajado a un área con riesgo que tiene un aviso para viajeros de los CDC sobre el zika, o
 - Hayan tenido relaciones sexuales sin protección con una pareja que vive en un área con riesgo de zika o haya viajado a un área con riesgo que tiene un aviso para viajeros de los CDC sobre el virus del Zika
- Mujeres embarazadas que viven en un área con riesgo de zika o que viajaron recientemente a un área con riesgo pero **sin** un aviso para viajeros de los CDC sobre el virus del Zika.
 - Si desarrollan los síntomas del zika o
 - Si su feto muestra en una ecografía anomalías que pudieran estar relacionadas con la infección del zika



Pruebas para diagnosticar zika en bebés

Los CDC recomiendan pruebas de laboratorio para estas personas:

- Todos los bebés nacidos de madres con evidencia de laboratorio de infección por el virus del Zika durante el embarazo
- Bebés con hallazgos clínicos o de diagnóstico neurológico por imágenes anormales que sugieren síndrome congénito de virus del Zika y una madre con posible exposición al virus del Zika, independientemente de los resultados de las pruebas de detección del virus del Zika en la madre

