


Etapa Crónica

Duración variable. Se caracteriza por trastornos cardíacos que ocasionan cansancio, palpitaciones y dolor en el pecho. También puede presentar crecimiento de órganos internos como corazón, esófago o colon para finalmente llevar a la muerte súbita.



Órganos principales atacados por el chagas

¿Qué hacer en caso de sospecha?

Si sospecha estar infectado debe acudir inmediatamente al promotor o al establecimiento de salud más cercano a su localidad.

Vigilar si alguien de la familia o colonia presenta los mismos síntomas o ha sufrido picaduras de insectos.

¿Cómo puedo evitar contagiarme?

No existe vacuna contra la infección, por lo tanto las medidas de control son a través de la eliminación de los insectos transmisores y la limpieza frecuente de la vivienda para evitar criaderos de chinches.

Es importante recordar que en el estado de Oaxaca, habitan este tipo de insectos, por lo que hay que aprender a reconocerlos para evitar el contagio



LA ENFERMEDAD DEL CHAGAS



¿La conoces?
¿Se puede prevenir?
¿Qué síntomas presenta?



Universidad de la Sierra Sur

¿Qué es la enfermedad de Chagas?

Es una enfermedad que se transmite de animales al ser humano ocasionada por un parásito llamado *Trypanosoma cruzi*, cuya transmisión natural es a través del excremento de insectos que se alimentan de sangre (*Triatomíneos*) conocidos comúnmente como chinches besuconas que son abundantes en áreas rurales de México.

¿Cómo se transmite?


- 1 La chinche pica a un individuo enfermo y al succionar la sangre ingiere millones de parásitos de *Trypanosoma cruzi*.



- 2 La chinche infectada pica a una persona sana. Después de alimentarse deja una gota de excremento contaminada con parásitos. Si la persona se rasca disemina el excremento a través de pequeñas lesiones en la piel ocasionando que el parásito ingrese a la sangre.

Otras vías de transmisión


Además existen otras formas de contraer la infección: por medio de la placenta o a través de la ingesta de leche materna de mujeres infectadas, transfusión sanguínea, trasplantes de órganos, ingesta de carne semicruda de animales parasitados y de bebidas contaminadas.



¿Cuáles son los síntomas?

Etapa Aguda

Sucede alrededor de dos meses posteriores a la picadura de la chinche. Se caracteriza por dolor muscular intenso, fiebre elevada y presencia de una inflamación en la piel, en el sitio donde picó el insecto.



Etapa Indeterminada

Esta sucede de cinco a veinte años e incluso puede durar toda la vida. Se caracteriza cuando la infección aparenta haber desaparecido espontáneamente.